

Is mijn papegaai ziek ?!?

"Hoe kan ik zien of m'n papegaai ziek is?" dit is een veelgestelde vraag bij dierenartsen en bij anderen die informatie verstrekken over en voor papegaaien. Papegaaien zijn prooidieren ze staan laag in de voedselketen. Roofdieren jagen met name op verzwakte, zieke en oudere prooien. Die zijn makkelijker te vangen. Dus dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat je als papegaai geen gemakkelijk doelwit wordt door te laten zien dat je ziek bent. Hoe komen we er achter dat ze ziek zijn? Observeer hem bij elke mogelijkheid. Zorg dat je weet wat en hoe hij zich gedraagt. Hou er rekening mee dat je papegaai zich vaak beter voordoet als jij bij hem in de buurt bent.

Slechte hygiëne en/of stress zijn factoren die er voor kunnen zorgen dat een papegaai ziek wordt. Zij benadelen het immuunsysteem. Als hij ziek wordt dan kun je dat vaak aan de veranderingen in zijn gedrag, uitwerpselen en houding zien. Dus let hier dan ook goed op. Zorg ook dat je het gewicht van je papegaai regelmatig bijhoudt. Eén keer in de maand wegen is normaal. Schrijf het gewicht telkens op in een soort logboekje of in een vogelpaspoort. Dan kan je dit ook tonen aan de vogeldierenarts. Dit geeft veel inzichten in de gezondheid van je vogel. Als het gedrag van je papegaai verandert, het gewicht verandert drastisch (ongeveer 10%) naar beneden of boven en je ziet enkele symptomen/kenmerken, consulteer dan z.s.m. een vogeldierenarts.

Er zijn verschillende kenmerken aan het uiterlijk waaraan je kunt zien of een papegaai ziek is. Vaak zijn dit heel kleine dingetjes, dus ken je papegaai! Sommige kenmerken kunnen per soort verschillen.

Uiterlijke kenmerken van ziekte

- Ogen: staan dof en/of glazig en zijn vaak dichtgeknepen. Er kan een afscheiding uit komen, de veren rondom zijn slordig en plakkerig.
- Snavel: overgroeit of misvormd. Let op rimpels net onder de neusgaten.
- Voorhoofd/neusgaten: er komt afscheiding uit de neusgaten, de veren rondom zijn slordig en plakkerig.
- Snavel/bek: ademt met de snavel open, bek is slijmerig en/of een witte plak in open bek.
- Vleugels: doffe veren met evt. stress lijnen. Bloedingen. Eén vleugel hangt lager dan de ander. laat beide vleugels hangen.
- Poten: korsten, of slechte huid met schilfers. Missende tenen (niet door toedoen van ziekte maar door recent trauma).
- Veren: pluizige, rafelige of gehavende veren. Grote kale gebieden. Verschillende breuken in een veeropbouw.
- Staart: gaat op en neer bij iedere ademhaling.
- Lichaam: houdt de kop en/of lichaam in een vreemde positie en ziet er oncomfortabel uit of heeft stuip trekkingen. Is extreem dun.
- Uitgang (Cloaca): vette uitgang, de veren rondom zijn slordig en plakkerig.

Gedragskenmerken van ziekte

- Houding: ziet er slaperig uit, doet weinig, zit op de bodem van het verblijf en/of wordt lastig gevallen door kooigenoten.
- Laat weinig of geen geluiden horen en zit met de snavel in de veren met één poot opgetrokken in het lijf.
- In-actief: speelt, klimt, vliegt en/of fladdert niet.
- Eet en drinkt slecht of zelfs helemaal niet. Zit bij de voerbak maar je ziet hem niet eten.
- Staat langere perioden met open snavel op de tralies van de kooi.
- Poetst zelden of nooit het verenkleed.

Ziekte herkennen aan de uitwerpselen

- De uitwerpselen worden karig, blijven uit, verschillen van kleur, zijn heel waterig (waterige uitwerpselen kunnen de eerste 24 uur na bijv. een verandering van omgeving of in de voeding normaal zijn)
- De uitwerpselen bevatten niet de normale hoeveelheid fecale materie, uraten of urine. Of één van de drie is abnormaal veel aanwezig.
- Verandering in de kleur van de uitwerpselen.
- De samenstelling en de frequentie van de uitwerpselen dienen goed in de gaten gehouden te worden. Zij geven vaak een eerste indicatie dat er iets mis is.




Gezonde uitwerpselen

Ontlasting (faeces)...

Urine (= vloeistof rondom het hoopje)

Uraten (= wit in het hoopje)



Een gezonde papegaai

De ogen zijn helder en open. Er is geen afscheiding te zien en de veertjes rondom zijn glad.

De bek, snavel en neusgaten zijn glad en er komt geen afscheiding uit. De snavel is dof en vetig en niet glanzend.


Er zit geen plaques of witte korstjes in de bek. Er is geen moeizame of opensnavel ademhaling.

Verenkleed en de vleugels zijn glad en niet gerafeld of kapot. De papegaai poetst zijn veren net als anders. Er zijn geen wondjes of andere bloedingen te zien.


De vogel laat zijn geluidjes horen en eet en drinkt normaal.

De staart beweegt niet bij het ademen.

Het gebied rond de "uitgang" (cloaca) is schoon en de veren zitten niet aan elkaar geplakt.



Een geel-groene kleurverandering kan duiden op anorexia, zweren, ziekte, virusinfectie of vergiftiging.



Diaree is een abnormale frequentie en natheid van de uitwerpselen. Dit wordt vaak veroorzaakt door bacteriën, parasieten, virussen, schimmels of Chlamydia.



Geel gekleurde uitwerpselen kunnen duiden op Chlamydia, Pacheco's virus of andere virale infectie.

Zwart of rode uitwerpselen duiden vaak op een zweer, inwendige bloeding of een inwendige verwonding.

Een zieke papegaai

De ogen zijn dof en glazig. Vaak knijpt de vogel met de ogen of ze zijn dicht.

De veertjes rond de neus zijn nat en plakkerig. Er komt afscheiding uit de neusgaten.

Het verenkleed is dof en niet glad en staat bol. Veren kunnen rafelig en beschadigd zijn.

Staart beweegt op en neer bij het ademen.

Veertjes rond de uigang (cloaca) zijn vies en plakkerig. De uitgang zelf is ook niet schoon.

